



Agrival

SOLUCIONES AGRÍCOLAS



Fungicida y Bactericida

Con extracto de gobernadora (*Larrea tridentata*)

Brasuma

Fungicida y Bactericida

Modo de acción:

Múltiples modos de acción y disrupción de la membrana celular

Ingredientes activos:

Extracto de gobernadora (*Larrea tridentata* 95.0% en peso, equivalente a 768.55 g de i.a./L.)

Tiempo de reentrada:

Esperar a que seque la aspersión

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha:

0 días (sin límite)


Intervalo entre aplicaciones:

5, 6, 7, 8 ó 14 días

Cultivos:


Agave, Aguacate, Ajo, Cebolla, Cebollín, Espárrago, Alfalfa, Árandano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora, Plátano, Berenjena, Chile, Chile habanero, Jitomate, Pimiento, Tomate de Cáscara, Café, Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía, Lima, Limón, Mandarin, Naranja, Pomelo, Tangerino, Toronjo, Mango, Piña y Vid.

Acondicionamiento del agua



- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6.5 a 7.5.

Condiciones para aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la aplicación




- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente
- Efectivo para realizar secuencias, alternativas o mezclas con insecticida de diferentes modos de acción.

Orden de mezcla del producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Densidad de la cobertura



- Utilice boquillas de cono.
- Tamaño de gota fina a media, de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en los tejidos donde se localiza la plaga.